

* CETTE ORDONNANCE DOIT ÊTRE APPORTÉE À VOTRE PHARMACIE POUR ÊTRE COMMANDÉE.

Allergo Inc.

2905, rue De Celles, suite 101 D
 Québec, QC G2C 1W7
 Téléc. : 581 814-1380
 allergolaboratoire.com

**Usage réservé
à la pharmacie**

Pour commander, envoyer la
 prescription par courriel au :
 allergocommande@lavoiepharma.ca
 ainsi vous recevrez une
 confirmation de réception.

Impression carte / Card print

Client DP+ : _____

Patient : _____ N.A.M. : _____

Adresse / Address : _____ Ville / City : _____

Code postal / P.C. : _____ Téléphone / Phone : _____

Coordonnées de la Pharmacie : _____

No téléphone pharmacie / Phone Nr pharmacy : _____

INHALANTS	
Chaque trousse = 12 mois de traitement Each kit = 12 months treatment	
Début traitement / Starting treatment <input type="checkbox"/>	Vaccin glyciné / Glycerinated vaccine <input type="checkbox"/> Vaccin précité à l'alun / Alum precipitated vaccine <input type="checkbox"/>
Trousse d'entretien Maintenance treatment <input type="checkbox"/>	Fiole # _____ Date rdv : / /
Vaccin 1 Vol. ou %	INHALANTS Allergènes / Allergens
	← Numéro bouteille →
	Chat / Cat (<input type="checkbox"/> peau / pelt <input type="checkbox"/> poil / hair) - 10 000 BAU / ml
	Acariens / Dust Mites-DF - 10 000 AU / ml
	Acariens / Dust Mites-DP - 10 000 AU / ml
	Mélange d'arbres / Tree Mix - 1 : 20 wt / vol.
	Bouleau / Birch - 1 : 20 wt / vol.
	Mélange de graminées / Grass mix - 100 000 BAU / ml
	Herbe à poux / Ragweed - 1 : 20 wt / vol.
	Mélange mauvaises herbes / Weed mix - 1 : 20 wt / vol.
	Autre / Other
	Autre / Other
	Autre / Other
	Autre / Other
	Autre / Other

**Immunothérapie informations
destinées aux cliniques**

AVANT DE DÉBUTER

Évaluer l'état du patient avant toute injection.

- 1- L'immunothérapie doit être administrée sous supervision d'un médecin apte à prendre en charge une réaction d'anaphylaxie
- 2- De l'adrénaline 1 :1000 I.M. (0,03-0,5 ml adultes et 0,01 ml/kg enfants), de l'oxygène et des solutés physiologiques doivent être accessibles.
- 3- Garder en observation les personnes ayant reçu une injection de désensibilisation pendant 30 minutes. Mesurer et noter l'induration au site d'injection.
- 4- Administrer selon protocole du produit.

**Immunotherapy informations
for clinical administration**

BEFORE YOU START

Assess the clinical state of the patient before any injection.

- 1- The subcutaneous immunotherapy should be administered under medical the supervision with the ability to handle an anaphylactic reaction.
- 2- Adrenaline 1: 1000 IM (0.3-0.5 ml in adults and 0.01 ml / kg in children), oxygen and physiological fluids must be accessible.
- 3- Remember to observe people who received an injection of desensitization for 30 minutes. Measure and record the induration at the injection site.
- 4- Administer according to product protocol.

Le prescripteur certifie que :

- L'ordonnance est une ordonnance originale;
- Le pharmacien identifié précité est le seul destinataire;
- L'original ne sera pas réutilisé.

Signature du médecin / Allergist : _____ M.D.

Licence no : _____ Date : _____

**Les allergènes utilisés pourraient différer selon le manufacturier. Pour la sécurité du patient, NE PAS SUBSTITUER.
 Allergens used could be different according to the manufacturer. For patient's safety, DO NOT SUBSTITUTE.**